

**ALLEGATO 2 / ANLAGE 2**

CATEGORIA IN BASE AL TRATTAMENTO IN ATTO  KATEGORIE JE NACH BEHANDLUNG	PAZIENTI INTERESSATI  BETROFFENE PATIENTEN	SOTTO-CATEGORIA  UNTER-KATEGORIE	QUANTITÀ MASSIMA TRIMESTRALE DI STRISCE REATTIVE  DREIMONATLICHE HÖCHSTMENGE AN REAGENZSTREIFEN		QUANTITÀ MASSIMA TRIMESTRALE DI ALTRI PRESIDI  DREIMONATLICHE HÖCHSTMENGE AN ANDEREN BEHELFFEN	
			GLICEMIA CAPILLARE  KAPILLARER BLUTZUCKER  CODICE/CODE 0043	CHETONI PLASMATICI  KETONKÖRPER IM BLUT  CODICE/CODE 0605	LANCETTE PUNGIDITO  LANZETTEN  CODICE/CODE 0021	AGHI PER PENNA  NADELN FÜR INSULINPEN  CODICI/CODES: 0001/0004
			<b>1 – Trattamento insulinico intensivo (basal-bolus, o microinfusore, o CGM)</b>  <b>1 - Patienten in intensivierter Insulintherapie (Basis-Bolus-Therapie oder mit Insulinpumpe, oder mit CGM)</b>	Pazienti di età ≥ 18 anni in trattamento insulinico intensivo (basal-bolus) se stabili Patienten ab18 Jahren in intensivierter Insulintherapie (Basis-Bolus-Therapie) falls stabil	1.1	750
Pazienti di età ≥ 18 anni in terapia con microinfusore, in terapia con CGM, o in trattamento insulinico intensivo (basal-bolus) se instabili Patienten ab18 Jahren mit Insulinpumpe, mit CGM, oder in intensivierter Insulintherapie (Basis-Bolus-Therapie) falls instabil	1.2	900		30	900	Pari al numero di iniezioni al giorno x 30 x 3; quantità arrotondata al centinaio superiore Entspricht der Anzahl der täglichen Injektionen x 30 x 3; Menge auf volle Hundert aufgerundet

	Pazienti di età < 18 anni Patienten unter 18 Jahren	1.3	900	60	900	Pari al numero di iniezioni al giorno x 30 x 3; quantità arrotondata al centinaio superiore Entspricht der Anzahl der täglichen Injektionen x 30 x 3; Menge auf volle Hundert aufgerundet
<b>2 – Trattamento insulinico non intensivo o combinato (ADO + insulina basale)</b>  <b>2 - Patienten in nicht intensivierter Insulintherapie oder in kombinierter Insulintherapie (orale Antidiabetikatherapie + Basis-Insulin-Therapie)</b>	Pazienti in compenso stabile con ADO + una insulina basale/die  Patienten, die mit oralen Antidiabetika + 1 Basalinsulininjektion/Tag stabil eingestellt sind	2.1	150	0	150	100
	Pazienti che iniziano il trattamento insulinico ( <b>per un periodo limitato di tre mesi</b> )  Patienten, die mit der Insulinbehandlung beginnen ( <b>für einen begrenzten Zeitraum von 3 Monaten</b> )  Pazienti con neuropatia autonómica, con tendenza spiccata all'ipoglicemia, a rischio elevato di ipoglicemia o a rischio di gravi conseguenze dell'ipoglicemia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per patologia concomitante</b> (coronaropatia, vasculopatia cerebrale, retinopatia proliferante)</li> <li>• <b>per la professione svolta</b> (autisti, piloti, operai sulle impalcature, etc.)</li> </ul> Patienten mit autonomischer Neuropathie, mit rezidivierenden Hypoglykämien, mit erhöhtem Risiko für Hypoglykämie bzw. für Folgeschäden aufgrund einer Hypoglykämie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>wegen Komorbidität</b> (koronare Herzkrankheit, zerebrale Vasculopathie, proliferante Retinopathie)</li> <li>• <b>wegen des ausgeübten Berufes</b> (Fahrer, Piloten, Gerüstarbeiter usw.)</li> </ul>	2.2	450	0	450	100

	Pazienti in compenso stabile che effettuano 2-3 iniezioni/die					
	Patienten mit guter Stoffwechseleinstellung, welche 2-3 Injektionen am Tag durchführen	2.3	350	0	350	300
	Pazienti con controllo glicemico stabile					
	Patienten mit stabilem Blutzuckerspiegel	3.1	75	0	75	200
	Pazienti con controllo glicemico instabile					
	Patienten mit un stabilem Blutzuckerspiegel	3.2	300	0	300	200
<b>3 - Secretagoghi (in monoterapia o in associazione con altri ADO o incretinomimetici iniettivi)</b>	<p>Pazienti con tendenza all'ipoglicemia iatrogena per la certificazione del rilascio/rinnovo patente (DL n° 59 del 30.04.2011)</p> <p>Pazienti con rischio elevato di ipoglicemia o a rischio di gravi conseguenze dell'ipoglicemia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per patologia concomitante</b> (coronaropatia, vasculopatia cerebrale, retinopatia proliferante)</li> <li>• <b>per la professione svolta</b> (autisti, piloti, operai sulle impalcature, etc.)</li> </ul>					
<b>3 - sekretagogische Therapie, (Patienten die mit Monotherapie oder mit einer kombinierten Therapie mit anderen oralen Antidiabetika-therapien oder Inkretin-Mimetika behandelt werden)</b>	<p>Patienten mit Tendenz zur iatrogenen Hypoglykämie für die Bescheinigung zur Ausstellung/Erneuerung des Führerscheins (GD Nr. 59 vom 30.04.2011)</p> <p>Patienten mit erhöhtem Risiko für Hypoglykämie oder mit Risiko für Folgeschäden aufgrund einer Hypoglykämie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>wegen Komorbidität</b> (koronare Herzkrankheit, zerebrale Vaskulopathie, proliferante Retinopathie)</li> <li>• <b>wegen des ausgeübten Berufes</b> (Fahrer, Piloten, Gerüstarbeiter usw.)</li> </ul> <p>Pazienti per i quali è necessaria una modifica della terapia (riscontro di ipoglicemie, infezioni ricorrenti con peggioramento progressivo del compenso metabolico, donne con l'intenzione di programmare una gravidanza) -<b>per un periodo limitato di tre mesi</b></p> <p>Patienten, für welche eine Änderung der Therapie notwendig ist (vermehrt auftretende Hypoglykämien, wiederkehrende Infektionen mit progressiver Verschlechterung der Stoffwechselkompensation, Frauen, welche eine Schwangerschaft planen) – <b>für einen begrenzten Zeitraum von 3 Monaten</b></p>					

<b>4 – Trattamento dietetico e/o con farmaci insulino-sensibilizzanti e/o DPP4-inibitori e/o incretino-mimetici iniettivi e/o SGLT2-inibitori</b>  <b>4 - Patienten in diätetischer Behandlung und/oder mit Medikamenten, welche die Insulinsensibilität steigern und/oder Inkretin-Mimetika und/oder DPP4-Hemmer und/oder SGLT2-Hemmer</b>	alla diagnosi e periodicamente e secondo giudizio clinico, per valutare l'andamento della glicemia nelle varie ore del giorno e a scopo educativo per il paziente  nach Diagnosestellung und periodisch nach klinischem Urteil, zur Bewertung des Blutzuckerablaufes in den verschiedenen Stunden des Tages und zur Schulung des Patienten	4.1	75 (per un periodo limitato di tre mesi – für einen begrenzten Zeitraum von 3 Monaten)	0	75 (per un periodo limitato di tre mesi – für einen begrenzten Zeitraum von 3 Monaten)	100
	Riscontro di ipoglicemie, infezioni ricorrenti con peggioramento progressivo del compenso metabolico, donne con l'intenzione di programmare una gravidanza  Patienten mit rezidivierenden Hypoglykämien, wiederkehrenden Infektionen mit progressiver Verschlechterung der Stoffwechsellkompensation, Frauen, welche eine Schwangerschaft planen	4.2	300 (per un periodo limitato di tre mesi – für einen begrenzten Zeitraum von 3 Monaten)	0	300 (per un periodo limitato di tre mesi – für einen begrenzten Zeitraum von 3 Monaten)	100
<b>5 – Diabete gestazionale</b>  <b>5 - Patientinnen mit Schwangerschaftsdiabetes</b>	In trattamento dietetico (3 postprandiali + 1 a digiuno)  in diätetischer Behandlung (3 nach dem Essen + 1 nüchtern)	5.1	375	30	375	0
	In trattamento insulinico intensivo (3 pre + 3 postprandiali + 1 a digiuno)  in intensivierter Insulintherapie (3 vor und 3 nach dem Essen + 1 nüchtern)	5.2	600	30	600	Pari al numero di iniezioni al giorno x 30 x 3; quantità arrotondata al centinaio superiore Entspricht der Anzahl der täglichen Injektionen x 30 x 3; Menge auf volle Hundert aufgerundet
<b>6 – Utilizzo di FGM</b>	Pazienti di età ≥ 18 anni Patienten ab 18 Jahren	6.1	275	30	275	Pari al numero di iniezioni al giorno x 30 x 3; quantità arrotondata al centinaio superiore Entspricht der Anzahl der

6. – FGM Benutzung						täglichen Injektionen x 30 x 3; Menge auf volle Hundert aufgerundet
	Pazienti di età < 18 anni Patienten unter 18 Jahren	6.2	450	60	450	Pari al numero di iniezioni al giorno x 30 x 3; quantità arrotondata al centinaio superiore Entspricht der Anzahl der täglichen Injektionen x 30 x 3; Menge auf volle Hundert aufgerundet