

Anlage A/ Allegato A

Papillomavirus (HPV)

<i>Risikogruppe</i>	Jugendliche (Männer und Frauen) 12. – 23. Lebensjahr (aktive Einladung: Männer und Frauen im 12. Lebensjahr, Frauen 17 Jahre und 23 Jahre im Rahmen des 1. Pap Tests).
<i>Risikogruppen</i>	<p><u>Personen mit folgenden Risiken:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Immunsupprimierte Patienten bis 26 Jahre mit folgenden Indikationen:<ul style="list-style-type: none">- angeborene oder erworbene Immunschwäche- HIV Infektion- Onko – hämatologische Pathologien (Leukämien, Lymphome multiples Myelom)- Weitere bösartige Neubildungen- Organ- oder Knochenmarktransplantation- Pathologien welche eine langfristige immunsuppressive Behandlung benötigen• Frauen die wegen HPV korrelierter Gewebsveränderungen Typ CIN2+ oder höheren Grades behandelt wurden <p><u>Risikofaktoren aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• männliche Homosexuelle

Papilloma virus (HPV)

<i>Gruppo a rischio</i>	adolescenti (maschi e femmine) 12° – 23° anno (chiamata attiva maschi e femmine del 12. anno di vita, coorte femmine 17enni e 23enni in occasione del 1. PAP test).
<i>Gruppi a rischio</i>	<p><u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none">• pazienti immunocompromessi fino all'età di 26 anni nelle seguenti situazioni:<ul style="list-style-type: none">- Immunodeficienze congenite o acquisite- Infezione da HIV- Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)- Neoplasie maligne- Trapianto d'organo o di midollo- Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine• donne già trattate per lesioni HPV-correlate di tipo CIN2+ o di grado superiore) <p><u>Persone a rischio per determinati comportamenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Uomini che fanno sesso con uomini