

Anlage B/ Allegato B

Herpes Zoster

Herpes Zoster (abgeschwächter Lebendimpfstoff - ZVL))	
<i>Gemäß Impfkalender</i>	Personen > 64 Jahre
<i>Risikogruppen</i>	<u>Risikopersonen aufgrund klinischer Indikation ab 50 Jahre</u> <ul style="list-style-type: none"> • Diabetes mellitus • Herz-Kreislauf-Erkrankungen • COAD
Herpes Zoster (rekombinant, adjuvantierter Impfstoff - RZV)	
<i>Risikogruppen</i>	<p>1. Risikopersonen ab 18 Jahre mit angeborener/erworbener Immundefizienz oder in Erwartung einer immunsuppressiven Therapie (Personen, bei denen die Verabreichung von Lebendimpfstoffen kontraindiziert ist). Folgende Zustände oder Erkrankungen müssen vorliegen:</p> <p>Primäre Immundefizienz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Störungen der angeborenen Immunabwehr: Störungen des Komplementsystems, der Phagozyten, sowie der Immunezellrezeptoren oder der Synthese von Zytokinen • Störungen der adaptiven Immunabwehr: Störungen der Produktion von Ig oder Ig-Unterklassen (Agammaglobulinämie, Variables Immundefektsyndrom-CVID, selektiver IgA-Mangel usw.) • Kombinierte T-Zell-Defekte (schwerer kombinierter Immundefekt-SCID, Di-George-Syndrom u.a) <p>Erworbene Immundefizienz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumoren in Radio-/Chemotherapie • Hämatologische Tumoren • Zustand nach Organ- oder Stammzelltransplantation • Chronische entzündliche Erkrankungen, unter diesen v.a. chronische entzündliche Darmerkrankungen (MICI/IBD) , rheumatologische Erkrankungen (chronische entzündliche Gelenkerkrankungen, LES, Vaskulitiden, autoinflammatorische Erkrankungen, neurologische, renale (chronische Nierenerkrankungen), hämatologische Erkrankungen (autoimmunhämolytische Anämie) • HIV-Infektion • Patienten in Therapie mit hochdosierten Cortisondosen (>20mg/Tag Prednison), zytotoxischen Substanzen, Calcineurininhibitoren, monoklonalen Antikörpern (mit Ausnahme der monoklonalen Antikörper ausschließlich für die Therapie der Osteoporose oder der atopischen Dermatitis) und mit anderen Substanzen mit immunsupprimierender Wirkung. <p>2. Personen mit chronischer Niereninsuffizienz in Dialyse</p> <p>3. Personen mit Rückfällen oder besonders schweren Formen an Herpes Zoster</p>
<i>Kostenlose Verabreichung</i>	Gemäß Impfkalender; Risikogruppen

Herpes Zoster

Herpes Zoster (vivo attenuato - ZVL)	
<i>calendario vaccinale</i>	Persone > 64 anni
<i>Gruppi a rischio</i>	<p><u>Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio a partire dai 50 anni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diabete mellito • Patologia cardiovascolare • BPCO
Vaccino anti Herpes Zoster (ricombinante adiuvato - RZV)	
<i>Gruppi a rischio</i>	<p>1. Soggetti affetti da alcune condizioni di rischio a partire dai 18 anni con immunodeficienza congenita/ acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva (soggetti per i quali non vi è indicazione all'utilizzo del vaccino vivo attenuato). Rientrano tra i soggetti immunodepressi almeno le seguenti condizioni:</p> <p>Immunodeficienza primaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • difetti dell'immunità innata: deficit del complemento, difetti delle cellule fagocitiche, difetti associati ai recettori cellulari e alla produzione di citochine; • difetti dell'immunità adattativa; deficit della produzione delle Ig o di sottoclassi di Ig (agammaimmunoglobulinemia, immunodeficienza comune variabile, deficit di IgA, ecc); • deficit combinati che coinvolgono la funzione delle cellule T (immunodeficienza severa combinata, sindrome Di George, ecc). <p>Immunodeficienza secondaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • tumori in trattamento chemio/radio terapeutico • tumori ematologici • trapianto di cellule staminali o di organo solido • malattie infiammatorie croniche tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI/IBD), malattie immunoreumatologiche (malattie infiammatorie articolari, LES, vasculiti e connettiviti sistemiche, malattie autoinfiammatorie...), neurologiche, nefrologiche (malattia renale cronica), ematologiche (anemia emolitica autoimmune), • infezione da HIV • pazienti in trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (20mg/die di prednisone), farmaci citotossici, inibitori della calcineurina, anticorpi monoclonali (ad esclusione dei pazienti in terapia con anticorpi monoclonali per la sola osteoporosi o per la sola dermatite atopica) e altri immunosoppressori). <p>2. Soggetti con insufficienza renale cronica in dialisi</p> <p>3. Soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster</p>
<i>Offerta gratuita</i>	secondo calendario vaccinale e per i gruppi a rischio;